



Н.А. Власов

ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Порцилис Ery+Parvo
против рожи и парвовирусной инфекции свиней

(Организация-производитель: «Intervet International B.V.»/
"Интервет Интернешнл Б.В.", Нидерланды)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Порцилис Ery+Parvo (Porcilis® Ery+Parvo).
Международное непатентованное наименование: Вакцина против рожи и парвовирусной инфекции свиней инактивированная.
2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций. Вакцина изготовлена из культуры парвовируса свиней (штамм PPV014), выращенного на культуре клеток почки свиньи SK-6 и культуры бактерий *Erysipelothrix rhusiopathiae* (серотип II, штамм M2), инактивированных формалином с добавлением в качестве адъюванта: 150 мг водного раствора а-токоферол ацетата и 60 мг полисорбата 80; пеногасителя - 0,1 мг симетикона; буферных компонентов - 12 мг натрия хлорида и 1,22 мг гидроксиметил аминотетана.
По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию белого цвета.
При хранении допускается выпадение осадка, который легко ресуспендируется при встряхивании флаконов с вакциной.
Вакцина расфасована по 20 см³ (10 доз), 50 см³ (25 доз), 100 см³ (50 доз) или 250 см³ (125 доз) во флаконы, соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
3. Флаконы с вакциной упакованы в картонные коробки. В каждую коробку вложена инструкция по применению вакцины.
Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.
4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С.
5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Вакцину во флаконах без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным внешним видом, с истекшим сроком годности, не использованную в течение 10 часов после вскрытия флаконов бракуют, обеззараживают кипячением в течение 20 минут и утилизируют. Утилизация обезвреженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней к возбудителю парвовирусной инфекции и рожи свиней через 2 недели после применения, продолжительностью 6 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе (2 см³) содержится не менее 9 log₂ гемагглютинирующих единиц парвовируса свиней (штамм PPV014) и 50 МЕ (международных единиц) бактерий *Erysipelothrix rhusiopathiae* (серотип II, штамм M2).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина предназначена для профилактики парвовирусной инфекции и рожи свиней.

9. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных.

10. Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтные свинки.

Вакцину вводят животным внутримышечно за ухом в дозе 2 см³.

Для профилактики парвовирусной инфекции свиноматкам и ремонтным свинкам вводят Порцилис Ery+Parvo однократно, не позднее, чем за 2 недели до осеменения.

Для профилактики рожи свиней вакцина Порцилис Ery+Parvo применяется в комплексе с вакциной Порцилис Ery. Животных прививают двукратно - вакцину Порцилис Ery вводят за 4 недели до или после применения Порцилис Ery+Parvo.

Ревакцинацию свиней проводят вакциной Порцилис Ery+Parvo за 2-4 недели перед каждым осеменением.

При проведении вакцинации соблюдают правила асептики и антисептики.

Перед применением вакцину нагревают до температуры 20-25°C и тщательно встряхивают. Для введения вакцины используют стерильные шприцы и иглы. Место инъекции обрабатывают 70%-ным раствором этилового спирта.

11. Симптомов проявления парвовирусной инфекции, рожи свиней или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичном и последующих введениях вакцины не установлено.

13. Следует избегать нарушений сроков введения вакцины, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики парвовирусной инфекции и рожи свиней. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных реакций и осложнений, как правило, не отмечается.

У отдельных вакцинированных животных могут наблюдаться субфебрильная лихорадка, угнетение, снижение аппетита и формирование незначительной припухлости в месте введения вакцины, которые исчезают самопроизвольно в течение 2-3 суток.

15. Запрещается использовать вакцину против парвовирусной инфекции и рожи свиней совместно с другими иммунобиологическими препаратами.

16. Продукты убоя и мясо от вакцинированных животных реализуют без ограничения независимо от срока вакцинации.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть обеспечены спецодеждой (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, перчатки и др.) и очками закрытого типа.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды.

При случайном введении препарата человеку, место инъекции необходимо немедленно обработать 70 % раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: «Intervet International B.V.», Wim de Korverstraat 35, P.O. Box 31 5380 AA Boxmeer, The Netherlands.

Адрес места производства лекарственного средства: «Intervet International B.V.», Wim de Korverstraat 35, P.O. Box 31 5380 AA Boxmeer, The Netherlands.

Инструкция по применению вакцины «Порцилис Ery+Parvo/Porcilis® Ery+Parvo против рожи и парвовирусной инфекции свиней инактивированная» разработана фирмой ООО «Интервет» (143340, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, дер. Яковлевское, Россия) совместно с «Intervet International B.V.» (Wim de Korverstraat 35, P.O. Box 31 5380 AA Boxmeer, The Netherlands).

С утверждением настоящей инструкции отменяется инструкция по применению вакцины Порцилис Ery+Parvo против рожи и парвовирусной инфекции свиней инактивированная, утвержденная Россельхознадзором 02.03.2007 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».