

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. Власов

20 ИЮН 2011

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины Порцилис Порколи Дилувак Форте,  
против колибактериоза и неонатальной энтеротоксемии  
поросят инактивированной

(Организация-производитель "Intervet International B.V."/ "Интервет Интернешнл Б.В.", Нидерланды).

### I. Общие сведения.

1. Торговое наименование: Порцилис Порколи Дилувак Форте (Porcilis® Porcoli Diluvac Forte).

Международное непатентованное наименование: Вакцина против колибактериоза и неонатальной энтеротоксемии поросят инактивированная.

2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из очищенного LT-токсоида и адгезивных пили-антигенов: K88ab, K88ac, K99 и 987P Escherichia coli, инактивированных хлорокрезолом и формалином, с добавлением: в качестве адьюванта -  $\alpha$ -токоферол ацетата - 150 мг и полисорбата 80 - 60 мг; пеногасителя - симетикона - 0,1 мг; буферных компонентов - натрия хлорида - 10,6 мг, калия хлорида - 0,16 мг, дигидрокалия фосфата - 0,16 мг, гидронатрия фосфата - 1,18 мг и физиологического раствора до 2 см<sup>3</sup>.

По внешнему виду вакцина представляет собой гомогенную суспензию белого цвета.

При хранении вакцины допускается выпадение осадка, который ресуспендируется при взбалтывании.

Вакцина расфасована по 20 см<sup>3</sup> (10 доз), 50 см<sup>3</sup> (25 доз) или 100 см<sup>3</sup> (50 доз) в стеклянные или пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные под вакуумом резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упакованы в индивидуальные картонные коробки, обеспечивающие их целостность. В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению вакцины.

Срок годности вакцины - 36 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Вакцину во флаконах без этикетки, с нарушением целостности и/или герметичности закупорки, с измененным внешним видом, подвергшуюся замораживанию, с истекшим сроком годности, не использованную в течение 3 часов после вскрытия флаконов, бракуют, обеззараживают кипячением в течение 30 минут и утилизируют. Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

## II. Биологические свойства.

7. Вакцина вызывает формирование иммунитета у свиноматок к колибактериозу и неонатальной энтеротоксемии через 14 суток после двукратного применения продолжительностью 4 месяца. Колостральный иммунитет у поросят, полученных от иммунизированных свиноматок, сохраняется 2 месяца.

Одна иммунизирующая доза ( $2,0 \text{ см}^3$ ) при введении в организм свиноматок стимулирует образование специфических поствакцинальных антител к адгезивным пили-антигенам эшерихий в титре: K88ab – не менее  $9,0 \log_2$ , K88ac – не менее  $5,4 \log_2$ , K99 – не менее  $6,8 \log_2$ , 987P – не менее  $7,1 \log_2$ ; к LT-токсоиду – не менее  $6,8 \log_2$ .

Вакцина безвредна, лечебным действием не обладает.

## III. Порядок применения

8. Вакцина предназначена для профилактики колибактериоза и неонатальной энтеротоксемии у новорожденных поросят.

9. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных.

10. Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтные свинки.

Вакцину вводят животным внутримышечно, за ухом в дозе  $2,0 \text{ см}^3$  за 6-8 и 2-4 недели до опороса.

Ревакцинацию проводят однократно за 2-4 недели перед каждым опоросом в дозе  $2,0 \text{ см}^3$ .

Перед применением вакцину нагревают до температуры  $20-25^\circ\text{C}$  и взбалтывают. Для введения вакцины используют стерильные шприцы и иглы. Место инъекции обрабатывают 70%-ным этиловым спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

11. Симптомов проявления клинических признаков колибактериоза, неонатальной энтеротоксемии или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичном и последующих введениях вакцины не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы и сроков вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики колибактериоза и неонатальной энтеротоксемии. В случае пропуска очередного введения вакцины, иммунизацию необходимо выполнить как можно скорее.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

У отдельных животных после вакцинации могут наблюдаться субфебрильная лихорадка, снижение активности и уменьшение аппетита, исчезающие в течение суток.

Возможно образование легкой припухлости на месте введения препарата, исчезающей в течение 14 суток.

15. Запрещается использовать вакцину Порцилис Порколи Дилювак Форте совместно с другими иммунобиологическими препаратами.

16. Продукты убоя, полученные от клинически здоровых животных реализуют без ограничения независимо от срока введения вакцины.

## IV. Меры личной профилактики

17. При проведении вакцинации необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые сапоги и перчатки) и обеспечены очками закрытого типа.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством воды.

При случайном введении вакцины человеку место укола необходимо обработать 70%-ным этиловым спиртом и обратиться к врачу.

20. Организация-производитель: «Intervet International B.V.», Wim de Körperstraat 35, P.O. Box 31 5380 AA Boxmeer, The Netherlands.

Инструкция разработана фирмой ООО «Интервет» (143340, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, дер. Яковлевское, Россия) совместно с «Intervet International B.V.» (Wim de Körperstraat 35, P.O. Box 31 5380 AA Boxmeer, The Netherlands).

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению вакцины Порцилис Порколи Дилувак Форте против колибактериоза и неонатальной энтеротоксемии поросят, утверждённая заместителем руководителя Россельхознадзора 27.06.2007 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ ВГНКИ.