



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

А.А. САВЕНКОВ

17 ИЮН 2026

ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата Нафпензал DC

Организация-разработчик: Интервет Интернешнл Б.В., Вим Де Кёрверстраат 35,
а/я 31 5830 AA Боксmeer, Нидерланды / Intervet International B.V., Wim de
Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands

Номер регистрационного удостоверения: 528-3-27.12-1087№ПВИ-3-4.0/00489

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
международное непатентованное наименование: прокаина
бензилпенициллин, дигидрострептомицина сульфат, нафциллин.

торговое наименование: Нафпензал DC (Nafpenzal DC)

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

Один шприц-дозатор (3 г) содержит действующие вещества: прокаина
бензилпенициллин - 300 мг, дигидрострептомицин (в форме сульфата) – 100 мг,
нафциллин (в форме натриевой соли) – 100 мг, и вспомогательные вещества:
алюминия дистеарат и жидкий парафин.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой мазь от
белого до почти белого цвета.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производи-
теля при соблюдении условий хранения и транспортировки – 2 года с даты произ-
водства. Содержимое шприца-дозатора необходимо использовать сразу после
вскрытия. Не применять по истечении срока годности.

4. Нафпензал DC выпускают расфасованным по 3 г в полиэтиленовые
шприцы-дозаторы для интрацистернального введения, наконечники которых
снабжены защитными колпачками из полиэтилена. Шприцы-дозаторы
упаковывают по 4 штуки в саше, которые помещают в картонные коробки вместе
с соответствующим количеством очищающих салфеток и инструкцией по
применению на русском языке.

5. Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат или отходы, возникшие при
его использовании, уничтожают в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение препарата. Условия отпуска в Российской Федерации: по рецепту (требованию).

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: комбинированные антибактериальные препараты для интрацистернального введения.

10. Бензилпенициллин – антибиотик из группы β -лактамов, обладающий бактерицидной активностью в основном против грамположительных бактерий, чувствителен к β -лактамазам (пенициллиназам). Нафциллин – полусинтетический пенициллин, устойчивый к действию пенициллиназы. Дигидрострептомицин – антибиотик группы аминогликозидов, обладающий бактерицидной активностью в основном против грамотрицательных бактерий.

Комбинация антибиотиков, входящих в состав Нафпензал DC, обладает синергидным действием в отношении основных возбудителей мастита: стафилококков (β -лактамные антибиотики и в некоторой степени дигидрострептомицин), стрептококков (β -лактамные антибиотики) и грамотрицательных бактерий (дигидрострептомицин).

Системная абсорбция в результате интрацистернального введения Нафпензала DC у крупного рогатого скота ограничена. Эффективный уровень нафциллина в секрете вымени крупного рогатого скота сохраняется до 4 недель, бензилпенициллина – до 8 недель, дигидрострептомицина – до 13 недель после введения препарата.

Нафпензал DC по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) и не оказывает раздражающего действия на ткани вымени в рекомендуемых дозах.

III. Порядок применения

11. Нафпензал DC применяют для лечения субклинических маститов, вызываемых бактериями, чувствительными к бензилпенициллину, дигидрострептомицину и/или нафциллину, в сухостойный период у коров.

12. Противопоказанием для применения Нафпензал DC является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, к антибиотикам группы β -лактамов или к дигидрострептомицину. Не применять Нафпензал DC коровам в период лактации и менее чем за 35 суток до отела.

13. При работе с Нафпензал DC следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения. После использования препарата необходимо вымыть руки. Не использовать шприц повторно.

Бензилпенициллин, нафциллин или дигидрострептомицин могут вызывать гиперчувствительность (аллергию) при инъекции, вдыхании или контакте с кожей. Следует избегать прямого контакта с препаратом. Не рекомендуется использовать лекарственный препарат при наличии у человека гиперчувствительности к одному из компонентов препарата. Повышенная

чувствительность к цефалоспорином может привести к перекрестной чувствительности к пенициллинам, и наоборот; иногда эти реакции могут иметь серьезный характер.

В случае появления аллергических реакций у человека, например, кожной сыпи, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Отек лица, губ или глаз, затрудненное дыхание являются более серьезными симптомами и требуют неотложной медицинской помощи.

14. Нафпензал DC предназначен для применения стельным коровам в сухостойный период. Не применять Нафпензал DC коровам в период лактации и менее чем за 35 суток до отела.

15. Нафпензал DC применяют интрацестернально, однократно в дозе 1 шприц-дозатор (3 г) на 1 четверть вымени после последней дойки перед переводом в сухостойный период, но не позднее, чем за 35 суток до предполагаемого отела.

Перед применением лекарственного препарата четверть вымени полностью освобождают от молока (секрета), сосок дезинфицируют очищающей салфеткой, поставляемой в комплекте с лекарственным препаратом. Удаляют защитный колпачок с наконечника шприца-дозатора, избегая контаминации наконечника. Осторожно вводят наконечник, частично или на всю длину. Содержимое шприца-дозатора (1 доза) осторожно выдавливают в четверть вымени, затем наконечник извлекают и аккуратно массируют четверть вымени для лучшего распределения лекарственного препарата.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Нафпензал DC в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии, применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомов передозировки при применении Нафпензал DC в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

18. При совместном применении Нафпензал DC с препаратами, обладающими бактериостатическим действием, возможно снижение эффективности вследствие антагонистического эффекта. Могут сформироваться резистентные бактерии, что приведет к перекрестной резистентности к другим β -лактамным антибиотикам или аминогликозидам.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении и отмене не выявлено.

20. Курсовое применение лекарственного препарата не предусмотрено.

21. Для пищевых целей молоко можно использовать через 60 часов после отела (при условии применения препарата за 35 суток и более до отела). Молоко, полученное до истечения установленного срока, разрешается использовать в корм плотоядным животным после кипячения. В случае если препарат был ошибочно введен лактирующим коровам, молоко нельзя использовать в пищу в течение 38 суток.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения Нафпензал DC.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

Интервет Интернешнл Б.В., Вим Де
Кёрверстраат 35, 5831 AN Боксmeer,
Нидерланды / Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer,
The Netherlands

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «Интервет», Россия, 143345,
Московская область, город Наро-
Фоминск, рабочий поселок Селятино, ул.
Промышленная, дом 81/1
cstrumoahdpoc@msd.com

Директор по регуляторным вопросам
и выводу препаратов на рынок
ООО «Интервет»



Самочернова А.В.