



КАТАЛОГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СВИНОВОДСТВА

О компании

ООО «Интервет» MSD Animal Health*

Офис MSD Animal Health Россия

ООО «Интервет»

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1

БЦ «Демидов»

119201, Россия, Москва

Тел.: +7 495 9567140

Факс: +7 495 9567141

www.msd-animal-health.ru

Merck Animal Health, известная как MSD Animal Health за пределами Соединенных Штатов и Канады, – это международное ветеринарное подразделение фармацевтической компании Merck.

Российское подразделение компании носит название ООО «Интервет» и является частью MSD Animal Health.

MSD Animal Health предоставляет широкий спектр продуктов и услуг для улучшения здоровья животных и поддержания их благополучия. Производство инновационных продуктов достигается за счет наличия широкой научной базы и отдела исследований и разработок. MSD Animal Health – это высокотехнологичное производство и команда профессионалов, которая тесно сотрудничает со специалистами свиноводческих комплексов на глобальном и локальном уровнях, чтобы поддержать производителей свинины в эффективном управлении их бизнесом.

Миссия MSD Animal Health – защитить и улучшить здоровье и благополучие животных.

Стратегическая цель компании – достигнуть стабильного роста путем постоянного обеспечения своих клиентов комплексными решениями и инновационными продуктами для улучшения здоровья животных, а также техническими сервисами, которые отвечают постоянно изменяющимся потребностям рынка.

Содержание

Основные правила биобезопасности на свиноводческих комплексах	4	Антибактериальные препараты	12	Растворитель для вакцин	29
		Зупрево 4%	13	Дилувак Форте	30
Правила эффективной вакцинации	6	Бактериальные вакцины	14	Вирусно-бактериальные вакцины	31
Инъектор IDAL для внутрикожной вакцинации	8	Порцилис AR-T DF	15	Порцилис® Ery+Parvo	32
		Порцилис APP.....	16	Порцилис® PCV M Hyo	34
		Порцилис® Porcoli DF.....	17		
		Порцилис ColiClos	18		
		Порцилис Ery	20		
		М+ПАК®.....	21		
		Порцилис Глессер	22		
Цифровой инструмент Porcus Lab	10	Вирусные вакцины	23	Гормональные препараты	35
Сервисная поддержка	11	Порцилис® Бегония	24	PG 600.....	36
		Порцилис® PCV	25	Регумат.....	38
		Порцилис PRRS	26		
		Порцилис® Parvo	28		




Основные правила биобезопасности на свиноводческих комплексах

Контроль за выполнением мер по биобезопасности, направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний, позволяет поддерживать высокий статус здоровья животных на предприятии.

Место расположения свиного комплекса

Производственные помещения должны находиться на удалении как минимум 3–5 км от потенциальных источников инфекции.




Свинокомплекс должен работать в режиме предприятия закрытого типа

Лица, посещающие производство, в течение двух недель не должны находиться в контакте со свиньями других хозяйств.


Важно не допускать контактов персонала со свиноголовьем других ферм (запрещается содержать свиней дома). Посетителям и персоналу после принятия душа необходимо переодеться и переобуться в спецодежду и спецобувь.



Зоны на территории должны разделяться на производственную (чистую) и административно-хозяйственную (грязную).



Вход и въезд на территорию предприятия должен осуществляться только через оборудованный санитарный пропускник с обязательной фиксацией в журнале регистрации.



Необходимо подвергать мойке и дезинфекции весь въезжающий на территорию транспорт, а также использовать перегрузочные рампы при отгрузках свиноголовья.



Территория предприятия должна быть огорожена забором.



Нельзя проносить на территорию фермы продукты питания.




Основные правила биобезопасности на свиноводческих комплексах




5

Комплектация свиноводческого комплекса



Комплектацию хозяйства необходимо производить от 1 поставщика с высоким статусом здоровья животных.



Карантин животных следует проводить с учетом противоэпизоотических мероприятий, разработанных в индивидуальном порядке для каждого хозяйства.

Контроль иммунного статуса в свиноводческом комплексе



Разработка и внедрение оптимальных лечебно-профилактических схем с учетом плановых мониторинговых, диагностических исследований.



Дератизация и дезинсекция согласно разработанному плану.



Контроль за механической очисткой и дезинфекцией помещений. Обеспечение основного принципа «все пусто – все занято».

Предупреждение иных факторов передачи



Следует проводить бактериологические исследования воды, входящего сырья для производства комбикормов.



Все материалы, поступающие на территорию, должны подвергаться дезинфекции.



Необходимо рядом с фермой разместить крематор для утилизации биоотходов с целью исключения контакта с утильзаводами.



Правила эффективной вакцинации

1. Хранение вакцины



Вакцину хранить и транспортировать согласно инструкции.



Флаконы без этикеток, с нарушением целостности и герметичности использовать запрещено.



По истечении срока годности вакцину не применять.

2. Подготовка к вакцинации



Клинический осмотр животных. Запрещено вакцинировать больных и ослабленных животных.



Оценивать каждую партию вакцины путем постановки биопробы (10–50 голов).



Перед вакцинацией ознакомиться с инструкцией по применению.



Перед применением необходимо рассчитать количество вакцинируемых животных и объем требуемой вакцины.

Нарушение правил вакцинации может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики

Правила эффективной вакцинации



7

2. Подготовка к вакцинации



Подготовить вакцину к работе согласно инструкции.



Для иммунизации использовать стерильные шприцы и иглы, соответствующие для каждой технологической группы в зависимости от возраста и веса животного.



Вакцину применять согласно рекомендованной схеме и дозировке.

3. При вакцинации животных следует



Соблюдать правила асептики и антисептики, обеспечение чистого сухого кожного покрова в месте инъекции с использованием для каждого животного отдельной иглы.



Соблюдать выбор места инъекции.



Избегать совместного применения вакцин с другими препаратами, если это запрещено в инструкции.



Проверять дозировку шприца после 100–500 инъекций.



После проведения вакцинации составить акт с указанием числа вакцинированных животных, наименования и количества вакцины, даты изготовления, номера и серии, завода-изготовителя, фамилий лиц, проводивших вакцинацию.

Нарушение правил вакцинации может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики



Инъектор IDAL для внутрикожной вакцинации

Плюсы безыгольного метода:

• Удобство для оператора

Снижается риск самоинъекции препаратом в сравнении с традиционной вакцинацией шприцем, так как у инъектора IDAL нет иглы.

• Благополучие животных

Вакцинация без боли и стресса¹.

• Исключается ятрогенный фактор

Отсутствует ятрогенный фактор передачи возбудителей в случае повторного использования игл (в т.ч. возбудителей РРСС), так как инъектор IDAL вакцинирует без иглы¹.

• Качество

Отсутствует риск попадания фрагментов сломанных игл в мышцы².

Инъектор IDAL вводит точно отмеренную дозу вакцины в толщу кожи под высоким давлением, благодаря чему снижается стресс у животных, а работа оператора во время проведения вакцинации становится легче.

Введение вакцины в дерму имеет ряд плюсов. При внутрикожной вакцинации специальные клетки, присутствующие в коже в высоких концентрациях, реагируют на вакцинные антигены. Вследствие чего внутрикожная вакцинация стимулирует ускоренный иммунный ответ^{1,2,3}.



¹ Темпл Д., Майнау Е., Абат М. и Мантека Х. Польза от внутрикожной вакцинации животных у беременных свиноматок. Управление здоровьем свиней (2017) 3: 9.

² Чейс С.С.Л., Дэниелс С.С., Гарсия Р., Милворд Ф., Нэйшн Т. Безыгольная инъекционная технология в свиноводстве: Прогресс в эффективности вакцин и качестве свинины. Безопасное производство свинины. 2008; 16(5): 254–261.

³ Саммерфилд А. Дерма как главное место для вакцинации. Международные темы по свиноводству. Октябрь 2014.

² Романи Н., Флашер В., Трипп С., Спарбер Ф., Эбнер С. и Стойцнер П. Таргетирование дендритных клеток кожи для улучшения внутрикожной вакцинации. Актуальные темы в микробиологии и иммунологии, 2012. 351: 113–138.

³ Теуниссен М., Ханифа М. и Коллин М. Ознакомление с иммунобиологией кожи человека и функциональной спецификой подмножеств дендритных клеток кожи для инновационного дизайна внутрикожной вакцинации. Актуальные темы в микробиологии и иммунологии, 2012. 351: 25–76.

Инъектор IDAL для внутрикожной вакцинации



9

IDAL 3G

- Можно использовать с вакцинами Порцилис PRRS и Порцилис® Begonia.

УЧЕТ

- Подключается к вспомогательному приложению для смартфона по Bluetooth.
- Возможность отслеживания сделанных вакцинаций.



УДОБСТВО

- Полностью заряженного аккумулятора хватает для проведения 1200 инъекций.
- Возможность введения вакцины в разные части тела.
- Оснащение предохранительными устройствами.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

- Обеспечивает введение препарата в нужной дозе.
- Срабатывает оповещение, если вакцина закончилась во флаконе.

Плюсы внутрикожного введения:

• Качество

Снижен риск повреждения мышц, так как IDAL вакцинирует без иглы.

• Эффективность

Антигенпрезентирующие клетки в эпидермисе вызывают иммунный ответ с участием широкого круга факторов^{1,2}.

¹ Романи Н., Флашер В., Трипп С., Спарбер Ф., Эбнер С. и Стойцнер П. Таргетирование дендритных клеток кожи для улучшения внутрикожной вакцинации. Актуальные темы в микробиологии и иммунологии, 2012. 351: 113–138.

² Теуниссен М., Ханиффа М. и Коллин М. Ознакомление с иммунобиологией кожи человека и функциональной спецификой подмножеств дендритных клеток кожи для инновационного дизайна внутрикожной вакцинации. Актуальные темы в микробиологии и иммунологии, 2012. 351: 25–76.



Цифровой инструмент Porcus Lab*

Porcus Lab – удобный цифровой инструмент по оценке легких и носовых раковин свиней для технических специалистов ООО «Интервет» (MSD Animal Health**).

Приложение позволяет проводить детальную оценку степени поражений легких и плевры при энзоотической пневмонии (возбудитель *Mycoplasma Hyorhynchopneumoniae*) и актинобактериальной плевропневмонии (возбудитель *Actinobacillus Pleuropneumoniae*). С помощью приложения Porcus Lab легко сделать сравнение действия таких препаратов как: Порцилис® PCV M Ню, М+РАС®, Porcilis APP и продуктов других производителей, применяющихся на комплексе.

Porcus Lab позволяет:

- проводить детальную оценку степени поражений легких, плевры и носовых раковин свиней на предприятиях;
- создавать подробные отчеты на основе собранной информации;
- построить базу данных;
- получить результаты оценки всего через несколько секунд.

Кроме того, с помощью приложения Porcus Lab можно сделать оценку степени поражений носовых раковин при респираторных заболеваниях, возбудителями которых являются *Bordetella Bronchiseptica* и *Pasteurella Multocida*. Приложение наглядно демонстрирует действие от применения Порцилис AR-T DF при постубойной диагностике носовых раковин свиней.

Анализ результатов оценки степени поражения легких и носовых раковин свиней в динамике помогает специалистам хозяйства отслеживать изменения производственных показателей, принимать оперативные управленческие решения, что напрямую влияет на повышение эффективности бизнеса.

Приложение Porcus Lab позволяет получить результаты всего через несколько секунд после завершения процедуры оценки.


* Поркус Лаб

** Здоровье животных

Сервисная поддержка от ООО «Интервет» (MSD Animal Health**)



11



* Поркус Лаб

** Здоровье животных



Антибактериальные препараты

Зупрево 4%

Зупрево 4%

Антибактериальный препарат пролонгированного действия

СОСТАВ

В 1,0 мл препарата содержится 40 мг тилдипирозина.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

При введении препарата «Зупрево 4%» средние концентрации тилдипирозина в легких достигают максимального уровня 4,3 мкг/г в течение 24 часов и медленно снижаются в течение 17 дней после применения препарата, указывая на абсорбцию в ткани-мишени.

При однократной инъекции препарата длительность действия составляет 17 дней.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Препарат вводят свиньям внутримышечно в дозе 4 мг тилдипирозина/кг, что соответствует 1 мл препарата на 10 кг массы животного, однократно.

В одно место вводится не более 5 мл препарата. Для обеспечения правильной дозировки и во избежание передозировки массу тела животного необходимо определить наиболее точно.

Не применять для животных с повышенной чувствительностью к компонентам препарата. Не применять внутривенно.

ФАСОВКА

20 мл, 50 мл, 100 мл и 250 мл¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. После первоначального вскрытия флакон с препаратом хранят в течение 28 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 9 дней после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.



13



Особенности:

- Помогает защитить от бактериальных патогенов, обуславливающих заболевания респираторного тракта свиней, таких как *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* и *Haemophilus parasuis*.
- Препарат вводится однократно.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Бактериальные вакцины

Порцилис AR-T DF
Порцилис APP
Порцилис® Porcoli DF
Порцилис ColiClos
Порцилис Ery
М+ПАК®
Порцилис Глессер

Порцилис AR-T DF

Вакцина против атрофического ринита свиней
инактивированная



15

СОСТАВ

Вакцина изготовлена из белка dO (нетоксичное производное с делецией дермoneкротического токсина *Pasteurella multocida*) и инактивированных клеток *Bordetella bronchiseptica*, штамм «Bb7». Одна иммунизирующая доза в объеме 2,0 мл содержит:

- не менее $6,2 \log_2$ титра нейтрализации (средний титр токсин-нейтрализующих антител, полученный после повторной вакцинации половиной дозы у кроликов) белка dO (нетоксичное производное с делецией дермoneкротического токсина *Pasteurella multocida*);
- не менее $5,5 \log_2$ титра агглютинации (средний титр агглютинации, полученный после однократной вакцинации половиной дозы у кроликов) инактивированной клетки *Bordetella bronchiseptica*;
- 150 мг водного адъюванта на основе dl- α -токоферил ацетата.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает выработку специфических антител против дермoneкротических штаммов *Pasteurella multocida* и *Bordetella bronchiseptica*, вызывающих прогрессивный атрофический ринит у свиней.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Препарат вводят свиньям в возрасте 18 недель и старше внутримышечно в область ушной раковины в объеме 2,0 мл (1 доза). Супоросных свиноматок и молодых свинок, ранее не вакцинированных вакциной «Порцилис AR-T DF», вакцинируют двукратно с интервалом 4 недели. Первая вакцинация должна быть проведена не позднее 6 недель до ожидаемого опороса. Ревакцинацию проводят путем однократной инъекции 2,0 мл (1 доза) вакцины за 2–4 недели до каждого последующего опороса.

ФАСОВКА

20, 50, 100 и 250 мл¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C в защищенном от света месте. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 10 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.



Особенности:

- Помогает защитить от прогрессирующей и не прогрессирующей формы атрофического ринита.
- Способствует выработке специфических антител на *Pasteurella multocida* и *Bordetella bronchiseptica* в молозиве свиноматки, для выработки кластрального иммунитета у поросят.
- Возможность проведения эрадикации атрофического ринита свиней в стаде¹.

¹ Фернандес Х., Кабаньес Х.К., Хименес М., Менхон Р., Бойо Х., Ромеро А., Маркос М. Последние исследования MSD Animal Health в рамках 11-го Европейского симпозиума по менеджменту здоровья свиней (ESPHM), 2019. 40: 27.



Особенности:

- Инактивированная, субъединичная, токсоидная вакцина, состоящая из мембранного ОМР-антигена и трех токсоидов (АРХ1, АРХ2, АРХ3).

Порцилис АРР

Вакцина против плевропневмонии свиней инактивированная субъединичная

СОСТАВ

Вакцина изготовлена из мембранного ОМР-антигена и трех токсоидов *Actinobacillus pleuropneumoniae* (АРХ I, АРХ II, АРХ III), с добавлением адъюванта (dl-α-токоферола ацетата), эмульгатора (полисорбата 80), пеногасителя (симетикона), консерванта (формальдегида) и буферного компонента (натрия хлорида).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю плевропневмонии свиней (*Actinobacillus pleuropneumoniae*) через 3 недели после двукратного применения продолжительностью 8 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцинируют супоросных свиноматок за 6 и 2 недели перед опоросом и поросят с 6-недельного возраста двукратно, с интервалом 4 недели. Вакцину вводят внутримышечно за ухом, в объеме 2 мл.

ФАСОВКА

100 мл (50 доз)¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. После вскрытия вакцина должна быть использована в течение 10 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных

Порцилис® Porcoli DF

Вакцина против колибактериоза и неонатальной энтеротоксемии поросят инактивированная



17

СОСТАВ

Каждая доза вакцины (2 мл) содержит: LT-токсоид и адгезивные пили-антигены *Escherichia coli*: K88ab, K88ac, K99 и 987P, инактивированные хлорокрезолом и формалином, адъюванты – α-токоферол ацетат и полисорбат 80; пеногаситель – симетикон; буферные компоненты – хлорид натрия, хлорид калия, дигидрофосфат калия, гидрофосфат натрия дигидрат и очищенную воду.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунитета у свиноматок к колибактериозу и неонатальной энтеротоксемии через 14 суток после двукратного применения продолжительностью 4 месяца. Колостральный иммунитет у поросят, полученных от иммунизированных свиноматок, сохраняется 2 месяца.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтные свинки. Вакцину вводят животным внутримышечно, за ухом в дозе 2 мл за 6–8 и 2–4 недели до опороса. Ревакцинацию проводят однократно за 2–4 недели перед каждым опоросом в дозе 2 мл.

ФАСОВКА

20 мл (10 доз), 50 мл (25 доз)¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 3 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.



¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Особенности:

- Защита от патогенных штаммов *E. Coli* и β -токсина, продуцируемого бактерией *Clostridium perfr.*

Порцилис ColiClos

Инактивированная вакцина против колибактериоза (эшерихиоза) и клостридиоза (анаэробной энтеротоксемии, вызываемой *Clostridium perfringens*) свиней

СОСТАВ

Вакцина изготовлена из инактивированных адгезивных штаммов *Escherichia coli*, содержащих антигены F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 (987P), токсин (LT) и *Clostridium perfringens* тип C с добавлением dl- α -токоферил ацетат в качестве адъюванта. Одна иммунизирующая доза (2 мл) вакцины содержит:

Компоненты *E. Coli*, определяемые ИФА:

- Фимбриальный адгезин F4ab (K88ab)
Титр антител $\geq 9,3 \log_2$
- Фимбриальный адгезин F4ac (K88ac)
Титр антител $\geq 6,5 \log_2$
- Фимбриальный адгезин F5 (K99)
Титр антител $\geq 7,5 \log_2$
- Фимбриальный адгезин F6 (987P)
Титр антител $\geq 7,4 \log_2$
- Термолабильный токсин (LT)
Титр антител $\geq 10,5 \log_2$

Компонент *Cl. perfringens*:

- Антиген типа C ≥ 20 ME

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцина применяется супоросным свиноматкам для защиты новорожденных поросят от колибактериоза и клостридиоза (анаэробной энтеротоксемии), вызываемого возбудителями *Cl. perfringens* типов C и A. Вакцину вводят свиноматкам и ремонтным свинкам внутримышечно в шею за ухом в объеме 2 мл (1 доза). Супоросных свиноматок и ремонтных свинок, ранее не вакцинированных вакциной Порцилис ColiClos, вакцинируют двукратно с интервалом 4 недели.

Первая вакцинация должна быть проведена за 6–8 недель до ожидаемого опороса. Ревакцинацию проводят путем однократной инъекции 2 мл (1 доза) вакцины за 2–4 недели до каждого последующего опороса.



ФАСОВКА

20 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл
и 250 мл¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C в защищенном
от света месте.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. После вскрытия флакона
вакцина должна быть использо-
вана в течение 10 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Особенности:

- Вакцину разрешено применять лактирующим животным и молодняку.
- Допускается одновременное применение вакцины Порцилис Егу с вакциной против парвовирусной инфекции свиней (Порцилис® Parvo).

Порцилис Ery

Вакцина против рожи свиней, инактивированная

СОСТАВ

Вакцина изготовлена из культуры бактерий *Erysipelothrix rhusiopathiae* (серотип II, штамм M2) – не менее 50 МЕ, инактивированной формальдегидом, с добавлением адъюванта (α-токоферол ацетата), эмульгатора (полисорбата 80), пеногасителя (симетикона), буферных компонентов (натрия хлорида и гидроксиметил аминокетана).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю рожи свиней через 3 недели после двукратного введения, продолжительностью не менее 6 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцинации подлежат поросята с 10-недельного возраста, которых иммунизируют двукратно, с интервалом 4 недели.

Хряков вакцинируют 2 раза в год, свиноматок – однократно в период каждой лактации, ремонтных свинок – однократно перед первым осеменением, не позднее чем за 2 недели до случки. Вакцину вводят внутримышечно в области верхней трети шеи, в объеме 2 мл.

ФАСОВКА

50 мл (25 доз), 100 мл (50 доз)¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 10 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных

Вакцина против энзоотической пневмонии свиней инактивированная эмульгированная



СОСТАВ

Вакцина изготовлена из культуры *M. hyorheumatis* (штамм ATCC #25934), инактивированной бинарным этиленимином с добавлением адъювантов: гидроксида алюминия и легкого минерального масла; эмульгаторов: полисорбата 80 и сорбитана моноолеата; стабилизаторов: этилового спирта и глицерола; консерванта: тиомерсала и 0,85% натрия хлорида.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней к возбудителю энзоотической пневмонии через 21 сутки после однократного или двукратного введения, который сохраняется в течение 6 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцинируют поросят в 7- или 21-дневном возрасте по следующей схеме:

- поросятам в возрасте 7 дней вакцину вводят в объеме 1,0 мл двукратно с повторной вакцинацией через 14–28 суток;

- поросят в 21-дневном возрасте вакцинируют однократно в объеме 2,0 мл или двукратно в объеме 1,0 мл с интервалом 2–4 недели.

Вакцину вводят внутримышечно в область шеи за ухом.

ФАСОВКА

50 мл (50 или 25 доз), 100 мл (100 или 50 доз)¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. Вакцину необходимо использовать в течение 8 часов после растворения.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.



Особенности:

- Включает в себя двухфазный адъювант.
- Применяется по гибкой схеме вакцинации: 1 или 2 инъекции при использовании 1 дозы вакцины.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Особенности:

- Протективный иммунитет в течение периода откорма до 200-го дня.

Порцилис Глессер

Вакцина против гемофильного полисерозита свиней инактивированная

СОСТАВ

Вакцина изготовлена из культуры клеток *Haemophilus parasuis* (V серотип, штамм 4800), инактивированной формальдегидом, с добавлением адъюванта (α-токоферол ацетата), эмульгатора (полисорбат 80), пеногасителя (симетикон), натрия хлорида, буферных компонентов и воды для инъекций.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю гемофильного полисерозита через 14 суток после двукратного введения вакцины, который сохраняется в течение периода откорма (до 200 дней).

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

В благополучных по гемофильному полисерозиту хозяйствах вакцинации подлежат поросята с 5-недельного возраста. Вакцину вводят внутримышечно двукратно с интервалом 2 недели. При угрозе инфицирования поросят, полученных от не иммунизированных свиноматок, вакцинируют начиная с 2-недельного возраста двукратно, с интервалом 2 недели.

В неблагополучных хозяйствах вакцинируют супоросных свиноматок двукратно за 6–8 недель и 2–4 недели перед опоросом и поросят с 5-недельного возраста двукратно, с интервалом 2 недели. Ревакцинацию свиноматок проводят однократно за 2–4 недели перед следующим опоросом.

ФАСОВКА

50 мл (25 доз).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.



Вирусные вакцины

Порцилис® Бегония
Порцилис® PCV
Порцилис PRRS
Порцилис® Parvo



Особенности:

- Вакцинный штамм ослаблен за счет отсутствия гликопротеина gI (gI-) и фермента tk (tk-), генетически стабилен и не распространяется между свиньями.
- Отсутствие гликопротеина gI (gI-) позволяет дифференцировать вакцинированных животных от животных, инфицированных полевыми штаммами вируса болезни Ауески.
- Отсутствие фермента tk (tk-) исключает возможность персистенции вакцинного штамма вируса в организме животного.

Порцилис® Бегония

Вакцина против болезни Ауески свиней живая сухая

СОСТАВ

Вакцина изготовлена из культуральной жидкости перевиваемой линии клеток (VERO), инфицированной вирусом болезни Ауески (генетически маркированный штамм Begonia), с добавлением в качестве стабилизаторов: сорбитола, натрия глютамата, глицина, амина, натрия гидрофосфата дигидрата.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней к возбудителю болезни Ауески через 3 недели после повторного введения, который сохраняется не менее 6 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцинации подлежат поросята (племенные и на откорме) с 14-недельного возраста. В благополучных хозяйствах необходимости в ревакцинации поросят на откорме нет.

В ситуациях, когда существует риск раннего заражения поросят, и молодых животных,

имеющих специфические материнские антитела, вакцинируют двукратно: первичную вакцинацию проводят в более раннем возрасте (с 10 недель) с ревакцинацией в 14-недельном возрасте или старше, но не ранее, чем через две недели после первичной иммунизации.

В неблагополучных хозяйствах племенных свиней вакцинируют 3 раза в год с 4-месячным интервалом.

ФАСОВКА

10 доз, 50 доз или 100 доз (по 1 мл – объем до лиофилизации) в стеклянных флаконах соответствующей вместимости¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C.

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев. Необходимо использовать в течение 8 часов после растворения.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных

Порцилис® PCV

Вакцина против цирковирусной инфекции свиней
инактивированная эмульгированная



25

СОСТАВ

Вакцина изготовлена из протективного антигена ORF2 цирковируса второго типа, с добавлением в качестве адъювантов dl-α-токоферол ацетата и жидкого парафина, эмульгатора – полисорбата 80, пеногасителя – симетикона и воды для инъекций. Каждая доза вакцины (2 мл) содержит не менее $4,5 \log_2$ протективного антигена ORF2 цирковируса второго типа.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к цирковирусу свиней второго типа через 2–3 недели после однократного введения продолжительностью 6 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцинации подлежат поросята начиная с 3-недельного возраста. Вакцину вводят внутримышечно однократно в дозе 2 мл в область шеи за ухом с помощью полуавтоматических инъекторов или шприцев, используя для каждого животного отдельную стерильную иглу.

Поверхность кожи на месте введения вакцины дезинфицируют 70% этиловым спиртом.

ФАСОВКА

50 мл (25 доз), 100 мл (50 доз),
200 мл (100 доз)¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Замораживание не допускается.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 8 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.



Особенности:

- Поствакцинальный иммунитет – 6 месяцев.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Порцилис PRRS

Вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCS) живая сухая с растворителем

СОСТАВ

Вакцина изготовлена из культуры клеток (Marc 145), инфицированной вирусом PPCS (штамм DV) с добавлением сахарозы, бычьего сывороточного альбумина и моносодия глютамата в качестве стабилизаторов, а также калий дигидрофосфата, натрия фосфата дигидрата, в качестве буферных компонентов. В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится не менее $10^{4,0}$ ТЦД₅₀ вируса PPCS (штамм DV).

Растворитель (Дилувак Форте) содержит: dl-α-токоферола ацетат в качестве адъюванта, полисорбат 80 в качестве эмульгатора, симетикон в качестве пеногасителя, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат, воду для инъекций.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю репродуктивно-респираторного синдрома свиней через 2 недели после однократного введения, который сохраняется не менее 6 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Поросят прививают с 2-недельного возраста. Маточное поголовье и ремонтных свинок вакцинируют за 2–4 недели перед каждым осеменением или массово, независимо от стадии супоросности, 3 раза в год, с интервалом 4 месяца. Хряков вакцинируют 3 раза в год, с интервалом 4 месяца.

Перед применением вакцину растворяют в Дилувак Форте, соблюдая правила асептики, из расчета 1 доза вакцины на 2 мл растворителя для внутримышечного введения или 10 доз вакцины на 2 мл растворителя для внутрикожного введения. Для иммунизации используют стерильные шприцы и иглы соответствующего размера. Вакцину вводят внутримышечно в объеме 2 мл в область верхней трети шеи, за ухом или 0,2 мл внутрикожно в верхнюю или боковые части шеи или вдоль мышц спины.

Особенности:

- Возможность вакцинировать с 14-дневного возраста.
- Поствакцинальный иммунитет сохраняется не менее 6 месяцев.



ФАСОВКА

Вакцина:

10 доз, 25 доз, 50 доз или 100 доз в стеклянных флаконах соответствующей вместимости¹.

Растворитель Дилувак Форте: 20 мл, 100 мл или 200 мл в стеклянных или пластиковых флаконах¹.

Растворитель Дилувак Форте может поставляться с вакциной или приобретаться отдельно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Вакцина:

от + 2°C до 8°C в сухом темном месте.

Растворитель Дилувак Форте: от + 15°C до 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ

Вакцина: 12 месяцев.

Растворитель Дилувак Форте: 21 месяц в пластиковых флаконах и 4 года в стеклянных флаконах.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Особенности:

- Помогает защитить эмбрионы и плоды от парвовируса.
- Продолжительность иммунитета не менее 6 месяцев.
- Допускается одновременное применение вакцины с вакциной против болезни Ауески (Порцилис® Бегония) и против рожи свиней (Порцилис Ery).

Порцилис® Parvo

Вакцина против парвовирусной инфекции свиней инактивированная

СОСТАВ

Вакцина содержит инактивированный парвовирус свиней (штамм 014), ростовую среду, α-токоферола ацетат, полисорбат 80, натрия хлорид, 35% раствор формальдегида, симетикон и воду для инъекций. В одной иммунизирующей дозе вакцины (2 мл) содержится не менее 552 единиц инактивированного парвовируса свиней (штамм 014).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю парвовирусной инфекции свиней через 2 недели после однократного введения продолжительностью не менее 6 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтные свинки. Свиноматок иммунизируют однократно по крайней мере за 2 недели до осеменения. Ремонтных свинок иммунизируют однократно в период от 8 до 2 недель до первого осеменения.

Ревакцинацию свиней проводят однократно не позднее чем за 2 недели перед следующим осеменением (каждые 5–6 месяцев).

Для введения вакцины используют стерильные шприцы и иглы. Вакцину вводят внутримышечно за ухом в дозе 2 мл.

ФАСОВКА

20 мл (10 доз), 50 мл (25 доз)¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 10 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Растворитель для вакцин

Дилювак Форте



Дилювак Форте

Растворитель для живых лиофилизированных вакцин против болезней свиней

СОСТАВ

Растворитель содержит: dl-α-токоферола ацетат в качестве адъюванта, полисорбат 80 в качестве эмульгатора, симетикон в качестве пеногасителя, натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат, воду для инъекций.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Дилювак Форте предназначен для растворения живых лиофилизированных вакцин Порцилис® против болезней свиней.

ФАСОВКА

20, 100 или 200 мл в стеклянных или пластиковых флаконах¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 15°C до 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года в пластиковых флаконах и 4 года в стеклянных флаконах.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

Особенности:

- Можно использовать с вакцинами Порцилис PRRS и Порцилис® Бегония.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Вирусно-бактериальные вакцины

Порцилис® Ery+Parvo
Порцилис® PCV M Hyo



Порцилис® Ery+Parvo

Вакцина против рожи и парвовирусной инфекции свиней инактивированная



СОСТАВ

Вакцина изготовлена из культуры парвовируса свиней (штамм 014), выращенного на культуре клеток почки свиньи SK-6 и культуры бактерий *Erysipelothrix rhusiopathiae* (штамм M2, серотип II), инактивированных формалином с добавлением адъюванта (водного раствора α-токоферола ацетата), эмульгатора (полисорбата 80), пеногасителя (симетикона), буферных компонентов (натрия хлорида и гидроксиметила аминметана), воды для инъекций. В одной иммунизирующей дозе вакцины (2 мл) содержится не менее 552 единиц парвовируса свиней (штамм 014) и не менее 50 ME антигена *Erysipelothrix rhusiopathiae* (штамм M2, серотип II).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа:

- к возбудителю рожи свиней через 2 недели после введения вакцины в комплексе с Порцилис Ery с интервалом 4 недели, продолжительностью не менее 6 месяцев;

- к возбудителю парвовирусной инфекции свиней через 2 недели после однократного введения вакцины, продолжительностью не менее 6 месяцев.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцинации подлежат свиноматки и ремонтные свинки. Вакцину вводят животным внутримышечно за ухом в дозе 2 мл.

Для профилактики парвовирусной инфекции свиноматкам и ремонтным свинкам вводят Порцилис® Ery+Parvo однократно, не позднее чем за 2 недели до осеменения.

Для профилактики рожи свиней вакцина Порцилис® Ery+Parvo применяется в комплексе с вакциной Порцилис Ery. Животных прививают двукратно – вакцину Порцилис Ery вводят за 4 недели до или после применения Порцилис® Ery+Parvo.

Ревакцинацию свиней проводят вакциной Порцилис® Ery+Parvo за 2–4 недели перед каждым осеменением (не реже 1 раза в 6 месяцев).

Особенности:

- Комбинированная защита против рожи свиней и парвовируса.



ФАСОВКА

20 мл (10 доз), 50 мл (25 доз),
100 мл (50 доз)¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C в защищенном
от прямых солнечных лучей
месте. Замораживание не допу-
скается.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. После вскрытия фла-
кона вакцина должна быть ис-
пользована в течение 10 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Особенности:

- Готовая к применению комбинированная вакцина против двух инфекций.
- Возможна ранняя вакцинация с 3-х дневного возраста 1 мл с ревакцинацией 1 мл через 18 дней.
- Снижение виремии и вирусной нагрузки, вызываемых цирковирусной инфекцией, на органы и лимфоидные ткани.
- Уменьшение поражения легочной ткани, вызываемого энзоотической пневмонией свиней.
- Снижение потери веса и смертности животных, вызываемых цирковирусной инфекцией и/или энзоотической пневмонией свиней.

Порцилис® PCV M Нуо

Вакцина против цирковирусной инфекции и энзоотической пневмонии свиней инаktivированная эмульгированная

СОСТАВ

В 1 мл вакцины содержится субъединичный антиген цирковируса свиней второго типа ORF2 не менее 1414 АЕ и инаktivированные клетки *Mycoplasma hyopneumoniae* (штамм J) не менее 2,69 единиц относительной активности, легкое минеральное масло (Drakeol 6VR), сорбитан моноолеат, полисорбат 80, алюминия гидроксид 3%, спирт этиловый 96%, глицерол 50%, раствор хлорида натрия 0,9%.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

После однократного введения вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней к возбудителям цирковирусной инфекции второго типа через 2 недели, к энзоотической пневмонии – через 4 недели. При двукратном введении вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней к возбудителям цирковирусной инфекции второго типа через 18 дней после первого введения, к энзоотической пневмонии – через 3 недели после ревакцинации. Независимо от схемы вакцинации иммунитет против цирковирусной инфекции второго типа сохраняется не менее 22 недель, иммунитет против энзоотичес-

кой пневмонии сохраняется не менее 21 недели после ревакцинации.

ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ И ДОЗИРОВКА

Вакцину вводят внутримышечно в область шеи за ухом однократно или двукратно:

- Однократная вакцинация: вакцину вводят поросётам с 3-недельного возраста в дозе 2 мл однократно.
- Двукратная вакцинация: вакцину вводят поросётам с 3-дневного возраста в дозе 1 мл с последующей ревакцинацией спустя 18 дней.

Двукратную вакцинацию рекомендуется применять при угрозе раннего заражения цирковирусной инфекцией и энзоотической пневмонией свиней.

ФАСОВКА

50 мл (25 или 50 доз), 100 мл (50 или 100 доз)¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

при температуре от 2°C до 8°C.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 8 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Гормональные препараты

PG 600
Регумат



Особенности:

- Применяют для стимуляции воспроизводительной функции свиноматок и ремонтных свинок.
- Безопасен для применения супоросным свиноматкам.
- Лекарственный препарат применяется для диагностики супоросности.

PG 600

Гонадотропин сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК), хорионический гонадотропин человеческий (ХГЧ)

СОСТАВ

Лекарственный препарат в одной дозе содержит в качестве действующих веществ 400 МЕ гонадотропина сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК) и 200 МЕ хорионического гонадотропина человеческого (ХГЧ), в качестве вспомогательных веществ – маннитол, динатрия гидрофосфата дигидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат.

В состав растворителя входит: динатрия гидрофосфата дигидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, вода для инъекций.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

При внутримышечном введении максимальная концентрация ГСЖК и ХГЧ в плазме у свиней достигается через 8 часов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Перед применением содержимое флакона растворяют в растворителе, поставляемом вместе с лекарственным препаратом. Полученный раствор вводят животным внутримышечно в околушную область в объеме 5 мл.

Сроки введения зависят от показаний к применению:

Повышение многоплодия свиноматок и индукция охоты сразу после отъема поросят: Введение с 0–2 дня после отъема поросят. Течка наступает на 3–7 день после введения.

Анэструс у ремонтных свинок: Введение в 8–10 месячном возрасте. Течка наступает на 3–7 день после введения.

Анэструс у свиноматок: Введение на 8–12 день после отъема поросят. Течка наступает на 3–7 день после введения.

Индукция и синхронизация половой охоты у ремонтных свинок: Введение в 6–7 месячном возрасте, при достижении живой массы 85 кг. Течка наступает на 3–7 день после введения.

Диагностика супоросности: Введение по 80 день после осеменения (случки). У небеременных животных появляется течка через 3–6 дней после введения. Лекарственный препарат безопасен для применения супоросным свиноматкам.



ФАСОВКА

Лекарственный препарат:

1 доза (400 МЕ+200 МЕ)

(по 0,5 см³ – объем до лиофи-
лизации);

5 доз (2000 МЕ+1000 МЕ)

(по 1,0 см³ – объем до лиофи-
лизации)¹.

Растворитель:

5 мл или 25 мл в стеклянных
флаконах объемом 5 мл или
30 мл соответственно¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 8°C.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. После растворения ле-
карственный препарат должен
быть использован в течение
24 часов.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Нет.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных



Особенности:

- Синхронизация половой охоты у свиноматок и ремонтных свинок.
- Препарат обладает действием, аналогичным гормону прогестерону. При пероральном приеме он сдерживает половой цикл, помогая устранить признаки половой охоты и овуляции.

Регумат

Препарат для синхронизации эструса и планового введения в технологические группы для осеменения ремонтных свинок; для синхронизации и усиления признаков охоты у отъемных свиноматок; для поддержания супоросных свиноматок

СОСТАВ

В 1 мл препарата содержится в качестве действующего вещества 4 мг алътреногеста, в качестве вспомогательных веществ содержатся бутилгидроксанизол, бутилгидрокситолуол, соевое масло.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Максимальная концентрация в плазме отмечается через 1 час после первого применения и сохраняется до 4 часов после применения последней дозы.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Препарат предназначен для орального применения. Препарат задается в дозе 5 мл (1 доза) индивидуально каждому животному один раз в день, в одно и то же время суток.

Ремонтные свинки:

Синхронизация эструса у ремонтных свинок с помощью Регумата позволяет осуществить их плановое введение (независимо от полового цикла животного на момент начала лечения) в группы основных свиноматок, значительно увеличить эффективность осеменения, увеличить количество поросят на одну свиноматку.

Регумат задается индивидуально с помощью специального орального шприца-дозатора непосредственно в рот животного на протяжении 18 дней в одно и то же время суток.

Отъемные свиноматки:

Применение Регумата у отъемных свиноматок может преследовать несколько целей:

- синхронизация и усиление признаков охоты, особенно это важно для первопоросившихся маток;
- повышение многоплодия;
- для задержки начала цикла, если по клиническому состоянию матки необходим ранний отъем.

Первоопоросным (проверяемым) свиноматкам Регумат задается в течение 5–9 дней. Основным свиноматкам Регумат задается в течение 3–5 дней.



Супоросные свиноматки:

У супоросных свиноматок Регумат применяется с целью поддержания беременности на последней неделе супоросности. Это особенно важно для высокопродуктивных (многоплодных) свиноматок.

Первая доза задается на 109 день, последняя – на 112 день супоросности. Длительность применения – 4 дня.

ФАСОВКА

Препарат выпускается в алюминиевой аэрозольной бутылке объемом 360 мл и алюминиевой или пластиковой бутылке объемом 540 мл и 1 л¹.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

от + 2°C до 25°C, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. После вскрытия использовать содержимое бутылки 540 мл и 1 л в течение 90 дней; данные сроки неприменимы для упаковочной тары объемом 360 мл, поскольку бутылка находится под давлением.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Убой животных на мясо допускается не ранее чем через 15 дней после прекращения применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

¹ Уточняйте наличие фасовок у торгового представителя ООО «Интервет» (MSD Animal Health*)

* Здоровье животных

Офис MSD Animal Health Россия

ООО «Интервет»
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1
БЦ «Демидов»
119201, Россия, Москва
Тел.: +7 495 9567140
Факс: +7 495 9567141
www.msd-animal-health.ru

Юридический адрес:

ул. Промышленная, д. 81/1
Россия, 143345,
Московская область,
Наро-Фоминский район,
поселок Селятино