

ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ВАКЦИНАЦИИ для Вашей собаки!



МАКСИМАЛЬНАЯ

Для собак с повышенным риском ИНФЕКЦИОННОГО КАШЛЯ СОБАК (часто контактирующих с другими собаками в парках, на игровых площадках, в клубах, выставках и т.д.).



Нобивак® DHP(Pi)**
Нобивак® L4
Нобивак® Rabies
Нобивак® KC

РАСШИРЕННАЯ

Для собак, вывозимых за город и путешествующих вместе с владельцами в различные регионы страны и таможенного союза.*



Нобивак® DHP(Pi)**
Нобивак® L4
Нобивак® Rabies

БАЗОВАЯ

Для собак, проводящих большую часть времени дома, прогулки которых осуществляются на поводке и ограничиваются двором.



Нобивак® DHP
Нобивак® L4
Нобивак® Rabies

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ об основных заболеваниях собак

Чума плотоядных, Парвовирусный энтерит, Инфекционный гепатит

Это самые опасные заболевания щенков и собак, вакцинация против которых обязательна во всем мире. К ним относятся системные заболевания вирусной природы, характеризующиеся тяжелым течением болезни, высоким риском развития осложнений и высокой летальностью. В эту группу входят чума плотоядных (**D**), парвовирусный энтерит (**P**), инфекционный гепатит (**H**). Источниками заболевания служат больные животные, бродячие собаки, дикие звери, возможно также опосредованное заражение через инфицированную почву, воду, предметы.

Инфекционный кашель собак (КС)

Инфекционный кашель (трахеобронхит) – высококонтагиозная остропротекающая инфекция собак, передающаяся воздушно-капельным путем, напоминая по своему характеру грипп человека. Хотя инфекционный трахеобронхит редко вызывает гибель животного, его осложнения могут принести много неприятностей собаке и владельцу (длительный кашель, иногда до нескольких месяцев; повышенный риск развития пневмонии; ослабление организма). И конечно же, на время лечения и восстановления можно забыть о поездках, путешествиях и общении с другими собаками.



Нобивак®

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

6 НЕДЕЛЬ

6 недель	10 недель	12 недель
Нобивак® Puppy DP Нобивак® L4 Нобивак® KC	Нобивак® DHP(Pi)* Нобивак® L4	Нобивак® DHP(Pi)* Нобивак® Rabies

8-9 НЕДЕЛЬ

8-9 недель	12 недель	Ежегодная
Нобивак® DHP(Pi)* Нобивак® L4 Нобивак® KC	Нобивак® DHP(Pi)* Нобивак® L4 Нобивак® Rabies	Нобивак® DHP(Pi)* Нобивак® L4 Нобивак® Rabies

12 НЕДЕЛЬ И СТАРШЕ

12 недель	14-16 недель	Ежегодная
Нобивак® DHP(Pi)* Нобивак® L4 Нобивак® KC Нобивак® Rabies	Нобивак® L4	Нобивак® DHP(Pi)* Нобивак® L4 Нобивак® Rabies Нобивак® KC

* Имеются в виду вакцины Нобивак® DHP и/или Нобивак® DHPPI.

ООО «Интервет»
Тел.: (495) 956-71-40
Факс: (495) 956-71-41
www.msd-animal-health.ru



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Выберите
**ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ
ВАКЦИНАЦИИ**
для Вашей собаки!

Нобивак®



RU-NOV-200100001



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

КАКАЯ ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ ПОДХОДИТ МОЕЙ СОБАКЕ?



МАКСИМАЛЬНАЯ

Для собак, общающихся друг с другом и путешествующих вместе с владельцем. Также программа рекомендуется для собак питомникового содержания и используемых в служебной кинологии.

Нобивак® DHP (Pi)
Нобивак® L4
Нобивак® Rabies
Нобивак® KC



РАСШИРЕННАЯ

Для собак, гуляющих без поводка, для охотничьих собак и собак, часто выезжающих за город.

Нобивак® DHP (Pi)
Нобивак® L4
Нобивак® Rabies



БАЗОВАЯ

Для собак, живущих в квартире или доме и проводящих большую часть времени дома. Прогулки ограничиваются двором и близлежащим парком.

Нобивак® DHP
Нобивак® L4
Нобивак® Rabies

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ об основных заболеваниях собак

Наиболее опасные инфекции выделены Всемирной Ассоциацией ветеринарных врачей мелких домашних животных (WSAVA) в отдельную группу и являются обязательными к вакцинации. Это такие заболевания как чума плотоядных (D), парвовирусный энтерит (P), инфекционный гепатит (H) и бешенство (R). В Российской Федерации к этой группе добавляют лептоспироз (L4).

Бешенство (Rabies)

Смертельное заболевание собак, кошек и других теплокровных, опасное для человека. Вакцинация против бешенства является обязательной на территории РФ. Домашний питомец может заболеть через укус больного животного (чаще всего диких лис или бродячих собак). На сегодняшний день эффективного лечения от бешенства не существует, 100% животных погибает.

Лептоспироз (Leptospirosis)

Лептоспироз у собак – это инфекционная болезнь, поражающая кровеносные сосуды, печень, почки и другие органы животного. Заражение может происходить несколькими путями, в основном, через контакт с больными собаками и зараженную воду в местах скопления грызунов (у ларьков, продовольственных магазинов). Нобивак® L4 – расширенная защита от лептоспироза за счет включения в вакцину двух дополнительных разновидностей возбудителя заболевания. В связи с высокой летальностью от лептоспироза вакцина Нобивак® L4 рекомендована собакам, активно передвигающимся по городу, выезжающим на природу, где увеличивается вероятность контакта с больными грызунами, дикими животными. Лептоспироз передается человеку, поэтому ветеринарные врачи часто рекомендуют делать расширенную вакцинацию против лептоспироза.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Нобивак®

* Имеются в виду вакцины Нобивак® DHP и/или Нобивак® DHPPI.