



ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата Метрикур

Организация-разработчик: Интервет Интернешнл Б.В.,
Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды/
Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer,
The Netherlands.

Номер регистрационного удостоверения: 528-3-13.16-3478№ПВИ-3-4.0/00490

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Метрикур (Metricure)
международное непатентованное наименование: цефапирин.

2. Лекарственная форма: суспензия для внутриматочного введения.

В одном шприце-дозаторе (19 г) содержится действующее вещество: цефапирин 500 мг (в форме бензатина) и вспомогательные вещества: макроглола цетостеариловый эфир -12, макроглола цетостеариловый эфир -20, гидрогенизированное касторовое масло, триглицериды средней длины цепи.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой маслянистую суспензию кремового цвета.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. Содержимое шприца-дозатора необходимо использовать сразу после вскрытия. Не применять по истечении срока годности.

4. Метрикур выпускают расфасованным по 19 г в полиэтиленовые шприцы-дозаторы для однократного применения. Каждый шприц-дозатор упаковывают вместе с катетером для внутриматочного введения и перчаткой для ректальной фиксации шейки матки в полиэтиленовый пакет. По 10 полиэтиленовых пакетов упаковывают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата на русском языке.

5. Хранить при температуре не выше 25°C.

6. Хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат или отходы, возникшие при его использовании, утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: антибактериальные средства, антибиотики группы цефалоспоринов.

10. Цефепим относится к антибиотикам группы цефалоспоринов первого поколения. Обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pseudintermedius*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Pasteurella multocida*, *Fusobacterium spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella spp.*

Антибиотик устойчив к действию пенициллиназы и сохраняет свою активность в аэробных и анаэробных условиях.

После внутриматочного введения лекарственного препарата цефепим всасывается в системный кровоток в очень незначительных количествах, максимальная концентрация цефепима в плазме крови достигается через 1 час после введения препарата и составляет 0,57 мкг/мл. Через 12 часов после введения препарата концентрация цефепима в плазме крови находится ниже определяемых значений. Цефепим легко проникает из полости матки в эндометрий, где сохраняется в бактерицидной концентрации до 24 часов.

Выводится антибиотик из организма после внутриматочного введения препарата главным образом с мочой.

Метрикур по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Метрикур применяют коровам для лечения подострой и хронической форм эндометрита (не ранее, чем через 14 дней после отела), вызываемого бактериями, чувствительными к цефепиму. Метрикур также можно применять для лечения скрытых форм эндометрита (более трех неудачных осеменений), если предполагается, что причиной проблем с фертильностью являются бактериальные инфекции.

12. Противопоказанием к применению Метрикур является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе к цефалоспорином и другим β -лактамным антибиотикам.

Запрещается применение Метрикур стельным коровам. Не следует применять препарат при выделении у больного животного микроорганизмов, устойчивых к цефалоспорином.

13. При работе с Метрикур следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Пенициллины и цефалоспорины могут вызывать реакции гиперчувствительности (аллергические реакции) после парентерального введения, вдыхания, приема внутрь или попадания на кожу. Гиперчувствительность к

пенициллинам может привести к перекрестной чувствительности к цефалоспорины и наоборот. В редких случаях могут возникать серьезные аллергические реакции на эти вещества.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Метрикур.

Необходимо соблюдать осторожность при работе с препаратом, при случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций, например, сыпи на коже, следует обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Отек лица, отек в области губ и глаз или затруднение дыхания являются более серьезными симптомами гиперчувствительности и требуют неотложной медицинской помощи.

14. Запрещается применение Метрикур стельным коровам. Лекарственный препарат может применяться в период лактации.

15. Содержимое одного шприца-дозатора Метрикур вводят коровам в полость матки с помощью одноразового катетера, соблюдая следующие рекомендации:

- Тщательно встряхивают шприц-дозатор.
- Соединяют шприц-дозатор с катетером.
- Надевают перчатку и ректально фиксируют шейку матки.
- Осторожно полувращающими движениями вводят катетер через шейку в полость матки.
- Выдавливают содержимое шприца-дозатора.

Для лечения подострой и хронической форм эндометрита Метрикур применяют не ранее, чем через 14 дней после отела. При необходимости (если сохраняются клинические проявления) лечение повторяют через 7-14 суток в той же дозе. Метрикур можно применять животным через день после осеменения. При пиометре рекомендуется предварительное введение простагландина, чтобы вызвать у животного лютеолиз желтого тела и освободить полость матки от гнойного экссудата.

Для лечения скрытых форм эндометрита препарат вводят через 6-24 часа после осеменения.

Перед применением лекарственного препарата следует провести исследование выделяемых больным животным бактерий на восприимчивость к антибиотикам. Если это невозможно, рекомендуется руководствоваться эпизоотической информацией о резистентности к целевым видам бактерий.

16. В очень редких случаях возможно появление аллергических реакций. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и проявлении аллергических реакций применение Метрикур прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Исследование безопасности лекарственного препарата Метрикур при введении в дозе, до 5 раз превышающих рекомендованную, в течение 3 дней подряд показало хорошую переносимость препарата у здоровых коров.

18. Запрещается одновременное применение Метрикур и других антибиотиков для внутриматочного введения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом введении или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений сроков применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности.

21. Убой коров на мясо и субпродукты разрешается не ранее, чем через 24 часа после последнего введения Метрикур. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко в пищевых целях может быть использовано не ранее, чем через 12 часов после последнего введения Метрикур.

Наименование производственной производителя препарата для применения:	и адрес площадки лекарственного ветеринарного	Интервет Интернешнл Б.В., Вим Де Кёрверстраат 35, 5831 AN Боксmeer, Нидерланды / Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.
---	---	---

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:	ООО «Интервет», Россия, 143345, Московская область, г. Наро-Фоминск, рабочий поселок Селятино, ул. Промышленная, дом 81/1).
--	--

Директор по регуляторным вопросам
и выводу препаратов на рынок
ООО «Интервет»



Самочернова А.В.